

## Checklista vid utbrott av magsjuka på särskilt boende

- Använd **alltid** basala hygienrutiner vid allt omvårdnadsarbete.
- Informera all personal om åtgärder som gäller i samband med magsjukan. Glöm inte "kringpersonal", t ex sjukgymnaster, vaktmästare.
- Isolera magsjuka vårdtagare. Håll dörren stängd till rummet/lägenheten. Tvätta och sprita händerna efter kontakt med magsjuk vårdtagare, när handskar tas av, före mathantering, medicindelning och annat rent arbete samt efter eget toalettbesök.
- Bufféserving avbryts, sjuka vårdtagare äter på rummet. Avdela om möjligt personal till mathantering som inte vårdat magsjuka vårdtagare och som inte nyligen haft magsjuka själva.
- Sätt upp skylt på dörren till enheten för information till personal och besökare.
- Registrera nyinsjuknade vårdtagare/personal dagligen. Överväg provtagning.
- Om vårdtagare skall skickas till sjukhus, meddela att magsjuka pågår på boendet.
- Rengör dagligen toalettsitsar, kranar handtag och hjälpmedel med Dax Ytdesinfektion plus eller Virkon 1 %.
- Städpersonal skall inte städa drabbade rum, det gör enhetens personal.
- Personalen bör byta arbetsdräkt dagligen och tvätta den i minst 60 ° C.
- Vårdtagare och personal betraktas som smittsamma i minst 48 timmar efter sista diarrén och kräkningen. Personalen bör inte återgå i arbete innan denna tid gått.